

Arranque de Lechones



Alta rentabilidad de 5 a 20 kilos de peso vivo

PROGRAMA “2,5 + 18”

PRODATEC dispone de un programa completo para el arranque de lechones, para las primeras 9 – 10 semanas de vida (63 – 70 días).

Después de muchos años de investigación, y de diferentes ensayos de campo, hemos obtenido el mejor programa y de mayor rentabilidad para esta fase. El programa de arranque de lechones lo denominamos “2,5+18”.

1. GODILAC (lactoniciador)

Suministramos 400 grs. de GODILAC por lechón. Es un lactoiniciador de porcino que por su composición y micronización especial nos permite elaborar fácilmente papillas para realizar alimentación líquida. Esto supone una transición a la alimentación en seco sin que se generen pérdidas de peso en el destete. Así, del día 1 al 4 suministramos 100 grs. de GODILAC por lechón y día más 500 – 600 cc de agua en un plato grande. En los comederos ponemos el PIGORLET-28 en seco a libre disposición. No sobrepasar los 100 grs. por día y animal de GODILAC para no saturar el lechón con papillas, y así comience a ingerir pienso en seco.

2. PIGORLET 28 (prestarter)

Administraremos 2,5 – 3 kgs. por lechón. PIGORLET 28 es un prestarter de “alta apetecibilidad” diseñado expresamente para los 8 – 10 días después del destete. Tiene 3 características muy importantes:

- Es muy apetecible
- Es muy digestible
- Proporciona un buen crecimiento


Pasada la franja más problemática del arranque del lechón, le proporcionaremos en las tolvas el pienso estarter lechones con MEGAPORC-15.

3. MEGAPORC-15 (estarter)

Del pienso de estarter (MEGAPORC-15) daremos de 18 – 20 kilos por lechón, llegando con ese pienso hasta las 9 – 10 semanas de vida. Con este consumo aseguramos un arranque óptimo de nuestros animales y con un bajo coste.



- Descripción del programa -



Las cantidades de **GODILAC**, **PIGORLET-28** y **Estarter** a suministrar, así como sus periodos de aplicación son variables, debiéndose adaptar a diferentes pesos y días de destete.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

1. Después del destete, si aplicamos el GODILAC en líquido, evitamos pérdidas de peso debido a la deshidratación del lechón.
2. Aseguramos el suministro correcto de energía, proteína y aminoácidos.
3. Conseguimos que el lechón aprenda a comer en seco (gradualmente).
4. Superamos sin problemas la fase más crítica del lechón, los 8 – 10 primeros días post-destete.
5. Conseguimos hacer crecer el lechón el máximo posible, y al mejor coste.